n° 52.

Observation sur une carie
au tibia
chirurgien à Chany par Vesoul

le Sieur francois B... portoit a la tete un galle de l'age de 4 ans, elle paroissoit pandant un et quelques fois deux mois, et disparoissoit en suite pour se remontrer quelques jours après plus violemment.

cette humeure periodique dura pandant sex ans jusqu'au 14 du mois de janvier 1791 ou elle disparut tous à coup. dans ce tems, il sentit de violentes douleurs à la partie superieure de la jambe gauche. la fievre et la rougeure accompagnerent la douleur. les accidens subsisterent l'espace de vingt jours et se terminerent par un leger depot.

on appliquat sur cette petite tumeure, les remedes convenable en de pareilles circonstances. la fluctuation se manifesta et on en fit methodiquement et selon l'art l'ouverture et les pensements. la cicatrice termina bientot la guerrison qui ne fut que apparente, tous les accidens se renouvellerent avec plus d'intencité. il survint un second depot à la mesme partie, ce depot fut ouvert et pensé comme le precedent, et la cure ne fut encore que apparente.

l'enfant marchoit, sens se plaindre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39
n° 158

du mois de mai, a très bien marché,
sans boiter, ni souffrir. cette augmentation de
l'os nebuiae laissé d'autre changement a
cette jambe que cette grosseur qui est d'environ
un pouce.

Vermillet

mais il ~~f~~ertoit. ce fut le 12 du mois de juillet de la
même année que le hazard me procura l'occasion
de voire son mal. sa jambe etoit très grosse
dans la partie superieure. le gorgement s'etendoit
jusqu'à la partie moyenne, ou l'on remarquoit un —
petit trou fistuleux, d'ou sortoit un pus sereux
et de mauvaise odeure. je decouvris par le moyen de
la sonde une carie au tibia, laquelle s'etendoit,
depuis le condile interne jusqu'au corps de cet os.

la dilatation en fut faitte dans toute son étendue
et la carie fut entierement découverte le pansement
fut simplement de charpie brutte et de compresses
soutenues par le bandage circulaire. a la levée
de cet appareil. qui ne se fit que 24 heures après,
la portion du tibia decouverte etoit vacillante et
de la longueure d'environ de deux pouces. sur six lignes
de largeure; elle fut enlevée sans resistance.
la grande cavité de ~~cett~~ cet os etoit ouverte, la
charpie seche trempée dans les spiritueux, dont
on remplissoit cette plaie fut le remede employé;
une legere suppuration s'etablit, et les accidens
cesserent. après 25 jours de pansements, on
fut obligé de faire une contre ouverture du
coté des muscles jumeaux, ou s'etoit formé

un Sicone de poti, on y passat une meche
la suppuration fut abondante pandant les dix
premiers jours; elle diminua insensiblement
ensuite. la meche fut supprimée, les chaires
se régénerent, la diette la plus severe, les
boissons humectantes et rafraichissantes. les
pillules fondantes données de quatre jours de
distances et le regime furent les remedes qui
opererent la guerisson. et le 20 9bre suivant
la cicatrice fut parfaite.

le 5 mai 1792, il se fit une ouverture à la
partie superieure de la cicatrice, il sortit de cette
ouverture deux petites esquilles d'os pointues
qui n'empecherent pas le jeune homme de
voyager et l'ouverture se referma bientot
après sans remede.

le suc nourrissier s'est porté à cette partie
de l'os malade plus abondamment qu'ailleurs. les
douleurs, les crispations, et le resserrement qui
sont arrivées à cette portion d'os carie lui ont
occationné une grosseur plus considerable que
dans l'état naturelle, au point que l'on pourroit
regarder cette excroissance come une fausse
exostose.

le jeune homme depuis l'epoque de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE